# Заключение по направлению на исследование №3133017903711 в «ГБУЗ МО «Одинцовская ОБ» (ЦАОП ООБ, г.Одинцово)»

Дата: **18.01.2022** МО: **ЦАОП ООБ, г.Одинцово (Онкология)**

Врач, выписавший направление: **Янкин Александр Николаевич**

Код (№ИБ): 10542233 ФИО: **АГЕЕНКОВ ВАЛЕРИЙ АРХИПОВИЧ**

Пол: **Мужской** Дата рождения: **28.09.1948, 73 лет** Полис: **7770150821001100**

---

Исследование: **Компьютерная томография живота с болюсным внутривенным контрастированием**

Описание: **Выполнено нативное исследование и дополнительное исследование с внутривенным введением контрастного вещества (артериальная, порто-венозная и отсроченная фазы), побочных реакций на введение контрастного препарата не отмечено. В анамнезе Cr сигмовидной кишки, состояние после операции, ПХТ. По сравнению с данными предыдущего исследования от 03.09.2021 определяется: На серии КТ органов брюшной полости печень имеет четкие контуры, вертикальным размером 159 мм. В паренхиме печени определяются два вида очагов: кистозные, жидкостной плотности, прежних размеров и количества; слабоплотные, незначительно накапливающие КВ, приобретающие четкость контуров в портальную фазу, несколько увеличившиеся в размерах (измеряемый очаг в S4 был 21 мм, стал 24 мм). Внутри- и внепеченочные желчные протоки не расширены. Ворота печени дифференцируются. V.portae в области ворот 18 мм. Содержимое желчного пузыря однородно. Селезенка имеет четкие ровные контуры, обычные размеры, форму и структуру. Поджелудочная железа в размерах не изменена (головка 26 мм), контуры ее четкие, структура паренхимы однородная. Вирсунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не инфильтрирована. Диффузное утолщение левого надпочечника, прежними размерами. Почки с обеих сторон имеют четкие ровные контуры, обычные размеры и форму. В паренхиме обеих почек кисты прежних размеров и количества. Паренхима почек после внутривенного введения контрастного вещества интенсивно повышает плотность. Экскреция своевременная. ЧЛС с обеих сторон не расширена. Пупочная грыжа, содержит петли тонкой кишки. В левой подвздошной области колостома. Рядом грыжевое выпячивание, содержащее петли тонкой кишки. На этом фоне создается впечатление о наличии межпетлевого, либо исходящего из культи сигмовидной кишки бугристого образования без четких контуров, размерами 33х45х37 мм, расположенного в брюшной полости перед грыжевыми воротами. Цепочка уплотненных не увеличенных лимфоузлов парааортально, прежних размеров. Костно-деструктивных изменений на уровне исследования не выявлено.**

Заключение: **Состояние после комбинированного лечения. Кисты печени. Вторичные изменения печени, отрицательная динамика. Гиперплазия левого надпочечника. Кисты почек. Пупочная грыжа. Грыжа в области колостомы. КТ-картина не позволяет исключить объемное образование (рецидив?) в области культи толстой кишки.**

Исследование завершено: 25.01.2022 Шумайлова Татьяна Максимовна