

## ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СТОМИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ В РОССИИ

**В.Г. СУХАНОВ**, доктор социологических наук, президент Национальной ассоциации больных с нарушениями функций экскреторной системы «АСТОМ»,

**Д.А. НАЗАРОВА**, вице-президент Региональной общественной организации инвалидов стомированных больных «АСТОМ», г. Москва

Сохранение существующей тенденции постарения населения Российской Федерации и роста его инвалидизации делает прогноз будущего страны крайне пессимистическим. Именно по этой причине возникает необходимость поиска инновационных решений, направленных на эффективное изменение социально-демографической ситуации, в частности на совершенствование ныне действующей системы медико-социальной экспертизы и реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая стомированных пациентов.

Главной выявленной причиной неэффективной реализации реабилитационного потенциала стомированных пациентов является то, что их медико-социальная реабилитация не содержит в себе специализированных стоматологических, конкретных реабилитационных мероприятий, не стандартизирована, исполняется изолированно при отсутствии комплексности, взаимодействия и координации с другими важными участниками реабилитационной помощи. Разрабатываемые в рамках службы медико-социальной экспертизы реабилитационные мероприятия для индивидуальной программы реабилитации стомированного инвалида прописываются формально без учета индивидуальных особенностей и проблем дезинтеграции инвалида. Фактически в предоперационный период – до стомириющей операции – пациент не получает никакой реабилитационной помощи. Реабилитация стомированного пациента без статуса «инвалид» не проводится. Катастрофически не хватает медперсонала, специально обученного основным навыкам по оказанию реабилитационной помощи стомированным пациентам.

В результате ныне действующая система медико-социальной реабилитации по сути занимается статистической фиксацией дезинтегрирующих факторов, влияющих на ограничение жизнедеятельности стомированных пациентов на уровне функциональных нарушений организма без комплексного учета причин нарушений функционирования в социуме.